

Max Male – Stimolatore di attività sessuale per uomo.

CODICE FEDERFARMA 910893270



Componenti: Tribulus Terrestris, Paullinia Cupana, Eleutherococcus Senticosus, Epimedium Grandi Florum, L.Arginina, Calcio Fosfato, Octacosanoli da Canna da zucchero, Gamma Orizanolo, Niacina.

Antiagglomeranti: Magnesio Stearato Vegetale, Silice Colloidale. **Capsule** in Gelatina Alimentare **Colorante** Titanio Biossido E171.

Confezione da 30 capsule da 570 mg.
Posologia consigliata: 2 capsule al giorno.
Prezzo di vendita : Euro 19.00

Indicazioni: E' un integratore di Niacina con estratti di erbe utili in casi di debolezza e apatia. Particolarmente formulato per incentivare lo stimolo sessuale e le capacità amatorie dell'uomo.

Terminologie e descrizione della funzione di alcuni degli ingredienti:

Tribulus Terrestris (Tribulin) : E' un'erba da secoli utilizzata tradizionalmente in India per aumentare la fertilità maschile e femminile e nella medicina cinese per la protezione del fegato, dei reni e delle disfunzioni del tratto urinario. Nell'antichità era considerato diuretico ed afrodisiaco; oggi si sa che può innalzare il tasso di LH nell'uomo e di FSH nella donna con aumento di testosterone nel primo e di ormoni femminili nella seconda.

Paullinia Cubana (GUARANA') : Pianta stimolante originaria dell'Amazzonia, Provoca uno stato diffuso di eccitazione

Eleutherococcus Senticosus (Eleuterococco) : anche chiamato Ginseng siberiano, pianta della famiglia delle Ederacee. Principi attivi : Glucosidi eleuterosidi, derivati cumarinici, saponine triterpeniche. Assenti saponine glicosidiche proprie del ginseng. Interviene nei casi di ipertensione arteriosa (come equilibratore), è un immunostimolante, immunomodulante. E' indicato per tumore, immunodeficienza secondaria o insufficienza immunitaria e malattie autoimmuni.

Epimedium : appartiene alla famiglia Berberidacee che come principi attivi ha flavonoidi, flavonoli polisaccaridi, olio essenziale, fitosteroli, tannini, acidi grassi. L'Epimedium è un tonico considerato molto importante nella pratica medica cinese e del quale sono stati dimostrati numerosi effetti farmacologici: aumento della funzione sessuale maschile negli animali da esperimento - ove la droga efficace è risultata quella trattata, inibizione della catecolamina, proprietà immunomodulanti - regolatrici del metabolismo degli acidi nucleici, ecc. Negli ultimi anni viene ampiamente usato in Cina per il trattamento delle malattie coronariche - ipertensione - bronchiti - nevralgia - epatite cronica - poliomielite - leucopenia cronica.

L.Arginina : E' un importante aminoacido e svolge importanti funzioni nel metabolismo cellulare. E' immunostimolante, aiuta nella guarigione delle ferite, rilascia il nitrossido (NO), partecipa alla sintesi della creatina, rigenera il tessuto del fegato. L'ossido nitrico



Made in Italy by CSPA – Centro Servizi Professionali Associati Srl

è fondamentale per la dilatazione delle arterie che portano una maggior quantità di sangue ai corpi cavernosi del pene nel momento dell'erezione. E' un importante modulatore della risposta vascolare, promuovendo un aumento della molecola GMP ciclico (monofosfato ciclico della guanosina). L'aumento di GMP ciclico provoca, tra le altre risposte ed in presenza dello stimolo mentale, l'erezione. Combatte la fatica fisica e mentale, aumenta la spermatogenesi, usata nel trattamento dei disordini epatici (fegato), si trasforma in L-ornitina ed urea, favorisce l'eliminazione dell'ammoniaca, la quale è un veleno per le cellule viventi. L'aminoacido arginina è vitale per la produzione dello sperma.

I Dott.ri F. Mantovani, E. Patelli, F. Colombo dell'Istituto di Urologia – IRCCS – Ospedale Maggiore di Milano hanno pubblicato al 47° Convegno SUNI tenutosi a Treviso nel settembre 1998 i risultati delle loro Ricerche relativamente al **Trattamento della astenia sessuale e dell'instabilità erettile con L-arginina cloridrato associata ad integratori naturali**, dichiarando: *“La riduzione dell'efficienza sessuale maschile, spesso accompagnata da diminuzione della libido, può manifestarsi anche in età relativamente giovanile (30-50 anni). La terapia in questi casi può rivelarsi importante. E' stata valutata l'efficacia dell'associazione L-arginina HCL + estratti di ginseng e guaranà + pappa reale liofilizzata. Non trascurabile motivo nella scelta dei principi attivi è stato la totale assenza di effetti tossici secondari a carico delle sostanze utilizzate. Il disegno sperimentale adottato è comparativo in doppio cieco. I trattamenti sono stati assegnati secondo uno schema randomizzato. 50 pazienti sono stati trattati con Levo-arginina HCL 2 g x 3/die ed associazione di pappa reale 200 mg + estratto fluido di ginseng 200 mg + guaranà estratto 40 mg/die. Il trattamento è stato protratto per sessanta giorni. Altri pazienti sono invece stati trattati con placebo. L'esame clinico è stato ripetuto a scadenza mensile. Il trattamento proposto ha determinato un miglioramento significativo del sintomo "intensità della libido" alla seconda e terza visita, e un miglioramento della durata dell'erezione alla terza visita. Tutti gli altri sintomi sono migliorati alla terza visita in misura statisticamente significativa ma inferiore, mentre il gruppo trattato con placebo non ha manifestato apprezzabili miglioramenti. I risultati ottenuti da questa prova clinica confermano l'utilità di un trattamento con arginina ed integratori naturali, nei confronti di pazienti giovani che manifestano diminuzione della funzionalità sessuale. Particolarmente interessante inoltre l'ipotesi di una ripetizione di cicli del trattamento nell'arco dell'anno a titolo di consolidamento dei risultati ottenuti e di prevenzione dei disturbi sofferti. Parole chiave: disfunzione erettiva - arginina - integratori naturali.*

Calcio Fostato : Ha le seguenti proprietà: 1) azione plastica essenziale per la formazione delle ossa e dei denti; 2) partecipa alle funzioni metaboliche necessarie per la regolazione dell'attività muscolare e nervosa, promuove una crescita e uno sviluppo regolari; 3) svolge un ruolo importante nel regolare le funzioni cardiache, renali, nella coagulazione e nell'integrità dei vasi venoarteriosi.

Octacosanoli da Canna da zucchero : Hanno proprietà immunostimolanti, aumentano la resistenza fisica e la biodisponibilità di glicogeno nei muscoli, migliorano i tempi di reazione nervosa, determinano un abbassamento del tasso di colesterolo nel sangue.

Gamma Orizanolo : E' una miscela di sostanze presenti nell'olio di crusca di riso, fra cui steroli, e acido ferulico. Stante alcuni studi gli si attribuisce la capacità di : innalzare i livelli di testosterone; innalzare i livelli dell'ormone della crescita; innalzare il livello delle endorfine.

Direzione Export : Via Canazei 20a, cap. 00124 Roma tel. +39 06 50910651 - 5053053

www.cspaitalia.com & www.arcadiacosmetics.com

e-mail : info@arcadiacosmetics.com

Made in Italy by CSPA – Centro Servizi Professionali Associati Srl

Niacina : o Vitamina B3 o anche Vitamina PP, comprende l'acido nicotinico e la nicotinamide, è un efficace disintossicante; è efficace per la circolazione e la riduzione del tasso di colesterolo nel sangue. E' vitale per una corretta attività del sistema nervoso, per il mantenimento della salute della pelle. La niacina è molto importante per il metabolismo del cervello ed è sostanza ricca di proprietà calmanti.

Viagra, Cialis, Levitra ... ed Impotenza

Impotenza – Cosa è!

Impotenza o meglio disfunzione o deficit erettile è l'incapacità di raggiungere o di mantenere l'erezione in presenza di adeguati stimoli sessuali.

Le cause possono essere :

- **fattori psicogeni** (più diffusi tra i giovani) come insicurezza, stress, sensi di colpa, ansia da prestazione, problemi di coppia, depressione, eiaculazione precoce;
- **fattori organici** ad esempio conseguenza di malattie quali diabete, disfunzioni venose, ipertensione arteriosa, insufficienza renale, traumi, lesioni al midollo spinale;
- **fattori iatrogeni** quali asportazione della prostata, operazioni invasive sulla vescica, sul retto, sull'aorta addominale, assunzione di medicinali quali diuretici, antipertensivi, anoressizzanti, tranquillanti, etc.

L'**erezione** si ha quando tramite le arterie del pene arriva un abbondante flusso di sangue ai **tessuti spugnosi dei corpi cavernosi** e nel **glande**. Il sangue, rimanendo intrappolato nei tessuti spugnosi, rende il pene duro. Normalmente il deflusso del sangue durante il rapporto sessuale viene bloccato mantenendo l'erezione. **Secondo le statistiche l'impotenza colpisce circa il 13% degli italiani, tra cui il 60 % di coloro che hanno più di 75 anni e il 20% di chi ha tra 50 e 54 anni.**

La diagnosi della disfunzione erettile.

A volte a causa dell'impotenza ci sono problemi di salute generale (non specifici del pene). **Ad esempio l'impotenza interessa uomini colpiti da diabete, ipertensione, elevata assunzione di medicinali.**

Il medico solitamente raccoglie tutte le informazioni che aiutano a capire meglio la causa del problema, successivamente passa ad un esame fisico valutando la salute generale, lo stato dei testicoli, del pene e della prostata. Il medico, per capire meglio, potrebbe prescrivere esami quali **analisi del sangue e urine** (glicemia, dosaggio di alcuni ormoni, PSA, rilevamento infezioni urinarie); **esame dello sperma e spermogramma** (valutazione della fertilità, presenza di microrganismi nello sperma); **ecografia prostatico-vescicolare trans-rettale** (valutazione delle condizioni della prostata e delle vescicole seminali); **ecocolordoppler dei testicoli** (valutazione strutturale e vascolare dei testicoli, eventuale varicocele, eventuale dilatazione delle vene dello scroto); **Rigiscan test** (valutazione del turgore e rigidità del pene durante l'erezione e la durata della stessa applicando alla base e all'apice del pene due anelli elastici collegati ad uno strumento); **valutazione eventuale danno neurologico**

Direzione Export : Via Canazei 20a, cap. 00124 Roma tel. +39 06 50910651 - 5053053

www.cspaitalia.com & www.arcadiacosmetics.com

e-mail : info@arcadiacosmetics.com

Made in Italy by CSPA – Centro Servizi Professionali Associati Srl

studiando i potenziali del nervo sacrale e del nervo pudendo; **Sci test** (test di 90 domande alle quali l'uomo deve rispondere valutando così impotenza causata da ansia, angoscia, depressione, fobie).

L'impotenza è un problema transitorio e può essere curata. Qualche tempo fa l'unico rimedio era la chirurgia con l'inserimento di una protesi nel pene oppure l'assunzione di sostanze quali la papaverina o il testosterone. Le cose col tempo sono cambiate ed, oggi, è possibile usare **terapie orali** (per bocca).

Visti gli effetti collaterali ed indesiderati che i prodotti somministrati per via orale possono generare, si suggerisce, anzi, solitamente, ci si raccomanda, di rivolgersi **SEMPRE** al proprio medico, prima di assumere prodotti composti atti a contrastare l'impotenza.

Impotenza : Suggestimenti.

Gli uomini che desiderano diventare padri evitano, per qualche tempo, la rilassante abitudine di fare lunghi bagni nella vasca con acqua molto calda; ciò, può compromettere la loro fertilità.

Uno studio americano, della **University of California di San Francisco**, condotto su undici (11) uomini con problemi di fertilità, ha dimostrato che temperature superiori a quella corporea (circa 37 gradi), come quella di un bagno caldo, danneggiano gli spermatozoi rendendoli meno attivi e vitali. Tutti gli uomini presi in esame, tra le loro abitudini, avevano quella di immergersi, per circa trenta (30) minuti la settimana, in una vasca con acqua molto calda. I ricercatori dopo aver valutato numero e vitalità degli spermatozoi degli uomini partecipanti al test, hanno poi richiesto che si facessero bagni tiepidi o freddi. Dopo tre mesi si è accertato che la vitalità degli spermatozoi era migliorata ed il loro numero si era sestuplicato, aumentando, in media, del 491 per cento (%).

Capiamo .. cosa sono il VIAGRA, il CIALIS ed il LEVITRA.

VIAGRA



Lo stile di vita moderno unitamente ad una alimentazione spesso sregolata sovente influisce negativamente, spesso "drammaticamente", sullo stimolo sessuale, il desiderio; nel complesso, sulla normale attività sessuale, arrivando, anche, a generare impotenza.

VIAGRA è il trattamento più conosciuto per la disfunzione erettile. Ciò che tutti sanno, per informazione diretta o indiretta, o per farne uso, è che ha una eccellente funzionalità. Ma, nella realtà, come funziona e con quale costo per la salute?? Esistono altri trattamenti e sono efficaci? L'85% degli uomini che usano il VIAGRA dichiarano che funziona egregiamente. Il VIAGRA stimola il flusso sanguigno, tanto da arrivare a provocare un'erezione, così che la disfunzione erettile può essere superata.

Made in Italy by CSPA – Centro Servizi Professionali Associati Srl


Comunque, VIAGRA, non tratta le cause della disfunzione erettile, e né tanto meno la guarisce. Se si ha realmente cura della propria salute, è necessario riflettere su quali sono gli effetti, anche indiretti, che l'uso del VIAGRA può causare. Riteniamo sia importante conoscere queste informazioni prima di divenire utilizzatori abituali del VIAGRA.

VIAGRA è una medicina relativamente sicura, ma non completamente senza rischi ed effetti collaterali, ed è importante non sottovalutarli. **Effetti collaterali del Viagra** : Come tutte le medicine, **Viagra**, a base di Sildenafil Citrate può provocare degli effetti collaterali. Questi effetti sono di solito miti e non durano per molto tempo. Alcuni effetti collaterali è più probabile che accadano facendo uso frequente ed assumendo dosi notevoli. Gli effetti collaterali più comuni sono mal di testa, senso di vertigine, e disturbi al sistema digestivo e gastro-intestinale.

Effetti collaterali meno comuni possono essere:

a) disturbi visivi; in particolare il NON riuscire a perfettamente focalizzare oggetti e colori (spesso capita di avere problemi a vedere correttamente il colore "blu" scambiandolo spesso per il colore "verde"), o, si risentono difficoltà nel distinguere detti colori tra di loro; **b)** risentire di un eccesso di fotosensibilità alla luce, oppure accusare appannamento alla vista; **c)** In rari casi, l'uomo può accusare un'erezione che arriva a durare per molte ore (con le problematiche ed imbarazzi che è semplice intuire). Si consiglia di subito rivolgersi ad un medico qualora l'erezione dovesse durare oltre le quattro ore. Il vostro medico di fiducia saprà offrire migliori e maggiori chiarimenti ed indicazioni relativamente all'uso del Viagra, agli effetti collaterali o ai sintomi oltre i quali è opportuno ricorrere ad un aiuto specializzato.

Sildenafil Citrate - Informazioni:



Sildenafil Citrate è l'ingrediente attivo usato nel Viagra per trattare la disfunzione erettile (l'impotenza) in uomini che soffrono di disfunzione erettile per ottenere e sostenere un'erezione quando si è sessualmente eccitati. Quando un uomo è

sessualmente eccitato, le arterie nel pene si rilassano ed allargano, permettendo un maggior flusso di sangue nel pene.

Quando le arterie nel pene si ingrandiscono ed induriscono, le vene che normalmente trasportano sangue fuori dal pene sono compresse, rallentando quindi il flusso di sangue che fuoriesce dal pene. Il maggior flusso sanguigno in entrata nel pene, e la minore quantità che ne defluisce determinano la crescita del pene e la conseguente erezione.

Sildenafil Citrate non può essere assunto da Tutti !! Specialmente chi usa medicine a base di nitrato, ed in particolare soffre di disturbi circolatori, cardiaci, dolori al petto (anche noto come angina) non può usarlo!!!

Il **VIAGRA** è venduto in compresse da 25 mg (euro 9.24 cadauna), da 50 mg (euro 10.79 cadauna), da 100 mg (euro 12.96 cadauna).

CIALIS.



Cialis è un trattamento per gli uomini con disfunzione erettile e impotenza. Il principio attivo è il Tadalafil, un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5). Dopo stimolazione sessuale il Tadalafil aiuta a rilassare i vasi sanguigni a livello penino, permettendo l'afflusso di sangue al pene. Il risultato è una migliore funzione erettile. Il Tadalafil non ha effetto in assenza di stimolazione sessuale. Il farmaco non deve essere usato da coloro che non soffrono di disfunzione erettile.

Controindicazioni. *Cialis* non deve essere assunto assieme al nitrato organico o a donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile. I nitrati trovano impiego nel trattamento dell'angina pectoris. *Cialis* inoltre non deve essere impiegato in soggetti con grave malattia cardiaca o con recente infarto miocardico, o ictus. La controindicazione è anche estesa alle persone con ipotensione o ipertensione non controllata. Inoltre è noto che l'attività sessuale comporta un potenziale rischio per i pazienti con coronaropatia perché sottopone il cuore ad uno sforzo maggiore. Devono evitare il farmaco anche i pazienti con grave malattia epatica o renale. Il *Cialis* non deve essere utilizzato assieme ad altri trattamenti per la disfunzione erettile. Poiché il *Cialis* contiene lattosio, il farmaco non dovrebbe essere assunto da pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, una carenza di Lapp lattasi e un malassorbimento di glucosio-galattosio.

Precauzioni d'uso. Nel corso di studi clinici sono state segnalate vertigini in uomini che assumevano *Cialis*. Questo deve essere tenuto presente prima di guidare un veicolo o utilizzare macchinari.

Informazioni farmaceutiche. Il *Cialis* è commercializzato in compresse di colore giallo chiaro rivestite con film, a forma di diamante e sono marcate 'C 10' da un lato. Queste compresse sono disponibili in blister in confezioni da 4 compresse. La dose raccomandata è una compressa da 10 mg prima dell'attività sessuale. Se l'effetto di questo dosaggio è troppo debole, il medico può aumentare la dose a 20 mg. Le compresse di *Cialis* devono essere assunte per bocca con un po' d'acqua. Si può assumere *Cialis* indipendentemente dal cibo. Si può assumere la compressa di *Cialis* in qualunque momento da 30 minuti a 12 ore prima dell'attività sessuale. *Cialis* può essere ancora efficace fino a 24 ore dopo l'assunzione della compressa. Il farmaco agisce solo se c'è stimolazione sessuale. Non si deve assumere *Cialis* più di una volta al giorno. L'uso giornaliero di *Cialis* è sconsigliato. Disponibili anche le compresse soft tabs sublinguali che agiscono in un tempo inferiore alle compresse: si possono dissolvere facilmente sotto la lingua (compresse sublinguali a rapida azione).

Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati più comuni dopo assunzione di CIALIS sono: **cefalea e disturbi digestivi**. Gli effetti indesiderati riportati meno comunemente sono: **mal di schiena, dolori muscolari, congestione nasale, vampate di calore al viso e vertigini**. Effetti non comuni sono: **gonfiore delle palpebre, indolenzimento agli occhi e occhi rossi**. Potrebbero manifestarsi anche reazioni allergiche (incluse eruzioni cutanee). **In casi rari, dopo l'assunzione di *Cialis*, è possibile che possa verificarsi una erezione prolungata e forse dolorosa**. Nel caso in cui l'erezione di questo tipo perdura per più di 4 ore di seguito, è necessario contattare immediatamente un medico. **In caso di comparsa di dolore al torace che si verifica**

Direzione Export : Via Canazei 20a, cap. 00124 Roma tel. +39 06 50910651 - 5053053

www.cspaitalia.com & www.arcadiacosmetics.com

e-mail : info@arcadiacosmetics.com

Made in Italy by CSPA – Centro Servizi Professionali Associati Srl

durante o dopo un rapporto sessuale, non si devono assumere nitrati, ma si deve cercare immediata assistenza medica. Raramente, in uomini che hanno assunto *Cialis*, sono stati segnalati battito cardiaco irregolare. La maggior parte di questi soggetti, ma non tutti, aveva problemi di cuore già prima di utilizzare il medicinale. Non è possibile determinare se questi eventi siano direttamente correlati all'uso del farmaco. **Prima di assumere il *Cialis* è sempre assolutamente indicato rivolgersi al proprio medico curante.**

Il ***Cialis*** è venduto in varie confezioni, tra queste: 20 mg 2 compresse euro 26.00; 20 mg 4 compresse euro 49.30; 20 mg 8 compresse euro 89.30.

LEVITRA (vardenafil).



Levitra (vardenafil) (detto anche **Vivanza**) della Bayer è un inibitore orale della PDE-5 per il trattamento della disfunzione erettile maschile e anti impotenza. La fosfodiesterasi tipo 5 (PDE-5) è l'enzima predominante presente nel tessuto erettile del pene ed è associata alle erezioni. Gli inibitori della PDE-5 bloccano tipicamente questo enzima per aumentare o prolungare la risposta erettile. La pillola è di colore arancione.

Levitra è controindicato negli uomini che assumono nitrati e donatori chimici di ossido nitrico (un gruppo di farmaci indicati per il trattamento dell'angina pectoris o dolori al petto). Levitra è inoltre controindicato negli uomini di età superiore ai 75 anni che fanno uso concomitante di potenti inibitori CYP 3 A4 (ritonavir, indinavir, chetoconazolo e itraconazolo). La sicurezza del vardenafil non è stata studiata nei seguenti sottogruppi di pazienti, e l'uso è quindi controindicato finché non saranno disponibili maggiori informazioni: pazienti con grave insufficienza epatica, stadi avanzati di malattie renali che richiedono dialisi, ipotensione, recente infarto del miocardio, angina instabile e alterazioni degenerative ereditarie della retina. Per la maggior parte dei pazienti la dose iniziale consigliata di Levitra è di 10mg assunti per via orale da 25 a 60 minuti prima dell'attività sessuale. L'effetto del Levitra può durare fino a quasi cinque ore. Levitra agisce direttamente sul pene e solo in fatto di stimolazione sessuale. L'effetto di Levitra comincia dopo circa 25 minuti e dura fino a cinque ore. Effetti collaterali possono essere mal di testa e rossore del viso. La ricerca è stata condotta su 805 uomini con disfunzione erettile. Il 75% del campione del gruppo che ha assunto il farmaco ha ottenuto un'erezione al primo tentativo, contro il 46% dei pazienti che avevano preso il placebo. Un tasso di successo che è salito al 91% fra i soggetti che hanno continuato la cura.

Il farmaco funziona con lo stesso meccanismo del sildenafil Pfizer (bloccano un enzima chiamato fosfodiesterasi-5) anche se con caratteristiche chimiche differenti e quindi, diversi tempi di azione.

Il **Levitra** è venduto in varie confezioni, tra queste: 10 mg 2 compresse euro 23.00; 10 mg 4 compresse euro 43.00; 10 mg 8 compresse euro 86.00; 20 mg 4 compresse euro 49.95.

Non si intende far utilizzare le nozioni contenute in queste pagine per scopi diagnostici o prescrittivi. Per qualsiasi trattamento o diagnosi di malattia, rivolgetevi ad un medico competente.